Synonymische Bemerkungen.

1. Einen neuen Beitrag zu der auf S. 357 bereits zur Sprache gebrachten systematischen Stellung der Gattung *Byturus* liefert H. K. Lindemann (Bull. de la Soc. imp. de Nat. de Moscou 1865. III. [1]) p. 148) völlig unbefangen dadurch, dafs er „dem Geiste der Endomychiden-Klassification folgend" für einen angeblich neuen Käfer „eine neue Gattung *Horticola* gründen mufs"; die neue Art *Horticola urbana* ist aber offenbar nichts Anderes als *Byturus tomentosus*.

2. *Oiceoptoma Golowatschovii* desselben Autors (a. a. O. p. 148. Taf. IV. Fig. 1, 2.) ist unzweifelhaft nichts als die bekannte *Silpha thoracica*, welche gerade die 4 erweiterten Endglieder der Fühler besitzt, durch die sich *Golowatschovii* von ihr unterscheiden soll.

3. Da mit *Oxypoda umbrata* Gyll. nach Thomson (Col. Scand.) nicht die von Erichson unter diesem Namen beschriebene Art, sondern die *cuniculina* Er. identisch ist, so mufs für *Oxyp. umbrata* Er. ein anderer Name eintreten, welcher *humidula* sein mag.

4. *Atomaria rubricollis* Bris. (in Grenier Cat. de Col. de France p. 68) ist mit *Atom. ornata* Heer (Faun. Col. Helv. I. p. 431) identisch; diese Art scheint in de Marseul's Cat. ed. II. aus Versehen ausgelassen zu sein.

5. Der von mir für eine neue Tenebrioniden-Gattung angewendete Name *Calobamon* ist bereits im Jahre 1850 von H. Loew an eine Dipteren-Gattung vergeben worden. Hierauf von ihm freundlichst aufmerksam gemacht, verwandele ich den Namen *Calobamon* in *Thraustocolus*. G. Kraatz.

[1]) Bei dieser Gelegenheit mag zugleich auf den ebendaselbst p. 65—112 veröffentlichten Aufsatz des H. Baron v. Chaudoir: Essai sur les Féronies de l'Australie et de la nouvelle Zélande aufmerksam gemacht werden.


2.
3.
7.
10.
8.
1.
11.
9.
12.
6.
5.
4.

13.

16.



14.

17.

18 A.



15.



19 A.

18 B.



19 B.



21 A.



20.



21 B.





Autores del. Tieffenbach sc.


1.
a
b
2.
a
b
3.
a
b
4.
a
b
5.
a
b
c
6.
a
b
c
7.
a
b
8.
a
b
9.
a
b
10.
a
b
11.
a
b
12.
a
b
13.
a
b
14.
a
b
15.
a
b